

26.05.2017

Seria 13 pożegnalna

Równania różniczkowe zwyczajne z przyległościami

1. Znajdź M^{2017} i e^M oraz rozwiąż równanie różnicowe $\vec{x}(n+1) = M\vec{x}(n)$ oraz różniczkowe $\frac{d}{dt}\vec{x}(t) = M\vec{x}(t)$ gdzie za M przyjmij macierze

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Znajdź rozwiązania ogólne równań

$$(a) y^{(7)} - 3y^{(6)} + 5y^{(5)} - 7y^{(4)} + 7y^{(3)} - 5y^{(2)} + 3y' - y = 0$$

$$(b) y''' + y'' + y' + y = xe^{-x} + \cos x$$

$$(c) y'' - 2y' + y = \cos(ax), a = const$$

$$(d) \frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$(e) \frac{d^2}{dx^2} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$(f) m \frac{d^2}{dt^2} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = q \begin{bmatrix} 0 & B & 0 \\ -B & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

3. Rozwiąż zagadnienia początkowe

$$(a) \frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ -2 & 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \\ y_3(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \frac{d}{dx} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin x \\ 2 \cos x \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) y' = \frac{4y}{x} + x\sqrt{y}, \quad y(1) = 1$$

$$(d) y' = \frac{y}{x} \ln |\frac{y}{x}|, \quad y(-1) = e$$

$$(e) \quad y'' = 2y^3, \quad y(0) = 1 = y'(0)$$

$$(f) \quad y'' + (y')^2 = 2e^{-y}, \quad y(0) = \ln 2, \quad y'(0) = 1$$

$$(g) \quad xy'' + y' = 4x, \quad y(-1) = 0 = y'(-1)$$